

Judo®

PORTUGAL
SOU EU

**Inseticida piretróide
de alta eficácia**

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Suspensão de cápsulas (CS)
c/ 9,7% (p/p) ou 100 g/L de lambda-cialotrina

Família química: Piretróide

Número de AV: 0175

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 25 mL, 250 mL, 1 L e 5 L



ATENÇÃO

Advertências de perigo: H302, H410

Recomendações de prudência: P270, P301+P312, P391, P501

Informações suplementares: EUH210, SP1, SPe3, SPe8, SPPT1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + **JUDO®** é um inseticida à base de lambda-cialotrina, da família química dos piretróides, que atua no sistema nervoso dos insetos alterando o fluxo de iões através da membrana nervosa.
- + Atua por contacto e ingestão, possui um forte efeito de choque e uma elevada persistência de ação.
- + **JUDO®** apresenta-se na forma de suspensão de cápsulas, uma formulação tecnologicamente avançada, que permite reduzir significativamente as perdas por volatilização já que a libertação da lambda-cialotrina apenas ocorre após a secagem da calda.

OBSERVAÇÕES

- + **JUDO®** tem uma importante ação repelente sobre os insetos, evitando-se assim novos ataques da praga.
- + Não perigoso para as abelhas quando aplicado de acordo com as indicações de utilização.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	CONC. mL/hL	DOSE mL/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Alface	Afídeos	12,5	125	Iniciar os tratamentos ao aparecimento da praga. Efetuar no máximo 2 tratamentos.	
	Escaravelho	15-20	150-200	Iniciar os tratamentos ao aparecimento da praga. Efetuar no máximo 2 tratamentos.	
Batateira	Nóctuas	7,5	75	Efetuar um tratamento generalizado ao solo, antes da infestação da cultura ou ao aparecimento da praga.	
Beterraba Sacarina	Afídeos	15	150	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	
Citrinos	Mosca do Mediterrâneo	12,5	125	Efetuar os tratamentos entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar no máximo 2 tratamentos com um intervalo mínimo de 7 dias. Alternar os tratamentos, com produtos com diferentes modos de ação.	
	Lagartas	7,5	75	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	
Couves*	Nóctuas	-	75	Efetuar um tratamento generalizado ao solo, antes da infestação da cultura ou ao aparecimento da praga.	7/10** dias
	Mosca Branca	15-20	150-200	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	
Feijoeiro	Mosca Branca	15-20	150-200	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	
	Bichado	7,5-10	75-100	Iniciar os tratamentos ao aparecimento da praga. Efetuar no máximo 2 tratamentos.	
Macieira	Afídeos	10	100	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	
	Mosca do Mediterrâneo	12,5	125	Efetuar os tratamentos entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar no máximo 2 tratamentos com um intervalo mínimo de 7 dias. Alternar os tratamentos, com produtos com diferentes modos de ação.	
Milho	Piral	20	200	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	60 dias
	Nóctuas	7,5	75	Efetuar um tratamento generalizado ao solo, antes da infestação da cultura ou ao aparecimento da praga.	
Oliveira	Traça	7,5	75	Iniciar o tratamento ao aparecimento das larvas, antes da abertura das flores.	-
	Bichado	7,5-10	75-100	Iniciar os tratamentos ao aparecimento da praga. Efetuar no máximo 2 tratamentos.	
Pereira	Afídeos	10	100	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	7 dias
	Mosca do Mediterrâneo	12,5	125	Efetuar os tratamentos entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar no máximo 2 tratamentos com um intervalo mínimo de 7 dias. Alternar os tratamentos, com produtos com diferentes modos de ação.	
	Psila	20-30	200-300	Iniciar os tratamentos ao aparecimento da praga. Efetuar no máximo 2 tratamentos.	
Pessequeiro, Ameixeira, Damasqueiro, e Nectarina	Mosca do Mediterrâneo	12,5	125	Efetuar os tratamentos entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar no máximo 2 tratamentos com um intervalo mínimo de 7 dias. Alternar os tratamentos, com produtos com diferentes modos de ação.	
	Mosca Branca	15-20	150-200	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	
Pimenteiro	Lagartas	20-25	200-250	Iniciar os tratamentos ao aparecimento da praga.	3 dias
	Nóctuas	7,5	75	Efetuar um tratamento generalizado ao solo, antes da infestação da cultura ou ao aparecimento da praga.	
Tomateiro	Mosca Branca	15-20	150-200	Iniciar os tratamentos ao aparecimento da praga.	28 dias
	Afídeos	7,5	75	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	
Trigo, Aveia e Cevada	Piral	7,5	75	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga.	7 dias
	Traça	17,5	175	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga, na altura da eclosão dos ovos.	
Videira	Mosca do Mediterrâneo	12,5	125	Efetuar os tratamentos entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar no máximo 2 tratamentos com um intervalo mínimo de 7 dias. Alternar os tratamentos, com produtos com diferentes modos de ação.	
	Traça	17,5	175	Efetuar um tratamento ao aparecimento da praga, na altura da eclosão dos ovos.	

*Couves de Folhas (portuguesa, galega); Couve nabiça e nabo greleiro; Couves de cabeça (repolho, lombardo e roxa) e Couve de Bruxelas; Couves de Inflorescência (brócolico e couve-flor)

**10 dias em brócolos ao ar livre

ALARGAMENTO DE ESPECTRO PARA USOS MENORES

CULTURA	PROBLEMA	CONC. mL/hL	DOSE mL/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Relvados	Lagartas	7,5	75	Efetuar os tratamentos ao aparecimento da praga, repetindo se necessário. Efetuar no máximo 2 tratamentos por ano com este ou inseticida do grupo dos piretróides.	-
Limoieiro	Traça do limoeiro	12,5	125	Efetuar os tratamentos ao aparecimento da praga.	-
Papoula dormideira	Nóctuas e ática	7,5	75	Aplicar dur ante o crescimento vegetativo da cultura na presença da praga. Efetuar no máximo 2 tratamentos.	35 dias
Espargo ornamental	Lagartas	7,5-15	75-150	Efetuar os tratamentos ao aparecimento da praga, repetindo se necessário. Efetuar no máximo 2 tratamentos.	-
Videira	Cigarinha dourada	17,5	175	Efetuar os tratamentos entre junho e outubro, seguindo as indicações do serviço Nacional de Avisos. Efetuar no máximo 2 tratamentos por ciclo cultural.	7 dias

OBSERVAÇÕES

+ A eficácia e a eventual fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.



Escaravelho batateira



Mosca Mediterrânea



Nóctua ou Rosca