

DELSTAR®

Inseticida piretróide
de amplo espectro de ação

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Concentrado para emulsão
(EC) c/ 2,8% (p/p) ou 25 g/L de deltametrina

Família química: Piretróide

Número de AV: 0405

Classificação ADR: 1993, 3, III

Embalagem: 30 mL, 1 L e 5L



PERIGO

Advertências de perigo: H226, H304, H318, H335, H410

Recomendações de prudência: P210, P261, P270, P280, P301+P310+P331, P305+P351+P338+P310, P501

Informações suplementares: EUH066, EUH210, SP1, SPe3, SPe8, SPoPT1, SPPT1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ➕ **DELSTAR®** é um inseticida de contacto, à base de deltametrina, pertencente ao grupo dos piretróides, que atua ao nível do sistema nervoso dos insetos, impedindo a transmissão dos impulsos nervosos.
- ➕ **DELSTAR®** tem um efeito letal sobre as formas ativas dos insetos.
- ➕ Apresenta uma elevada lipofilidade, essencial para uma aderência à cutícula dos insetos.

OBSERVAÇÕES

- ➕ **DELSTAR®** tem ação repelente sobre os insetos, ajudando a prevenir novos ataques.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ➕ **DELSTAR®** não deve ser misturado com produtos alcalinos.
- ➕ Não aplicar o produto diretamente sobre flores de ornamentais.
- ➕ Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- ➕ Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	CONC. mL/hL	DOSE mL/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Batata	Escaravelho	30 - 50	300 - 500	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade, não excedendo 3 aplicações.	7 dias
Tomate	Lagartas Mosca branca das estufas			Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade com intervalos de 3 semanas, não excedendo 3 aplicações.	3 dias
Macieira Pereira	Bichado da fruta Afídeos - especialmente piolho verde			Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na sua ausência aplicar a partir de meados de maio, com intervalos de 15 dias. Não realizar mais de 3 aplicações por ciclo cultural. Aplicar ao aparecimento da praga, molhando bem todas as partes verdes da árvore. Repetir em caso de necessidade. Se existirem infestações com enrolamento das folhas, recorrer a um inseticida sistémico. Não realizar mais de 3 aplicações por ciclo cultural.	
Pereira	Psila	75	750	Tratar ao aparecimento da praga molhando todos os órgãos da planta. Repetir o tratamento se necessário.	7 dias
Pessegueiro Damasqueiro Ameixeira Cerejeira	Afídeos - especialmente piolho verde do pessegueiro	30 - 50	300 - 500	Aplicar ao aparecimento da praga, molhando bem todas as partes verdes da árvore. Repetir em caso de necessidade. Se existirem infestações com enrolamento das folhas, recorrer a um inseticida sistémico. Não realizar mais de 3 aplicações por ano cultural.	
Cerejeira	Mosca da cereja			Tratar após o aparecimento da praga repetindo se necessário, não excedendo as 3 aplicações.	
Couves*	Lagartas Nóctuas			Aplicar ao aparecimento da praga e repetir o tratamento em caso de necessidade.	
Alface	Nóctuas			Tratar após instalação da cultura pulverizando a planta junto ao solo, e o solo envolvente.	3 dias
Videira	Cicadela ou cigarrinha verde	30 - 50	300 - 500	A aplicação deve ser feita quando se encontrarem 100 larvas em 100 folhas e a partir de julho quando houver 50 larvas em 100 folhas.	7 dias
	Traça da uva	40 - 60	400 - 600	Efetuar os tratamentos de acordo com os Serviços de Avisos; na sua ausência fazer o primeiro tratamento antes da floração (1ª geração) e o segundo antes do estado bago de ervilha (2ª geração).	
	Ática	30 - 50	300 - 500	Tratar ao aparecimento da praga repetindo o tratamento se necessário.	
Cereais de Inverno	Lagarta de sete-coiros Afídeos	-	300	Aplicar ao aparecimento da praga	30 dias
Milho	Nóctuas Piral	- -	300 500	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade, tendo em atenção um intervalo de 14 dias entre aplicações.	
Oliveira	Mosca da azeitona Traça da oliveira	40 - 60	400 - 600	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir o tratamento em caso de necessidade, respeitando um intervalo de 14 dias entre aplicações. Não realizar mais de 3 aplicações por ano cultural.	7 dias
Aveleira	Afídeos	50	500	Aplicar ao aparecimento da praga, repetindo o tratamento em caso de necessidade, respeitando um intervalo de 14 dias entre aplicações.	30 dias
Ornamentais	Afídeos			Aplicar ao aparecimento da praga, repetindo o tratamento em caso de necessidade, respeitando um intervalo de 14 dias entre aplicações.	-

*Couve nabiça e nabo greleiro; Couves de cabeça (repolho, lombardo e roxa); Couves de inflorescência (brócolo e couve-flor)



Escaravelho



Lagarta tomate



Mosca branca