

Fungicida

Ekyp® Trio

Fungicida anti-míldio sistêmico triplo

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Pó molhável (WP) com 4,8 % (p/p) de cimoxanil + 40 % (p/p) de folpete + 8 % (p/p) metalaxil

Família química: Acetamida, N-tiotrihalometilo (ftalimida) e fenilamida

Número de AV: 1620

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 250 g e 5 kg



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **EKYP® TRIO** é um fungicida sistêmico, com ação preventiva, curativa e anti-esporulante para o controle do míldio da videira. Contém 3 substâncias ativas (s.a.) na sua composição, que lhe conferem um triplo modo de ação: contacto - folpete; penetrante - cimoxanil; sistêmico - metalaxil
- **EKYP® TRIO** pela sua tripla composição apresenta maior eficácia biológica, maior uniformidade no controle da doença e menor risco de desenvolvimento de estirpes resistentes
- Assegura uma proteção eficaz dos novos lançamentos e uma elevada persistência de ação - 12 a 14 dias
- O **EKYP® TRIO** é o único fungicida triplo à base de fenilamidas, o que lhe confere a manutenção de eficácias elevadas em situações onde se verificam quebras de eficácia àquele grupo de fungicidas
- Recomenda-se a aplicação de **EKYP® TRIO** em situações de elevado risco de ocorrência da doença, como sejam o crescimento ativo da videira, a floração e a deteção da presença e pressão do míldio na região

CULTURA	DOENÇA	CONC. (g/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
VIDEIRA (UVAS DE MESA)	Míldio	250	2,5	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, os tratamentos com este produto devem ser feitos em condições favoráveis ao míldio, entre o estado de 7-8 folhas e o estado de "bago grão de chumbo", a persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias.	28
VIDEIRA (UVAS PARA VINIFICAÇÃO)				Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, os tratamentos com este produto devem ser feitos em condições favoráveis ao míldio, entre o estado de 7-8 folhas e o estado de "bago grão de chumbo", a persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias.	42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não efetuar mais de 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas
- EKYP® TRIO não afeta a fermentação nem as características organolépticas dos vinhos
- As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada por forma a que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura

