

Fungicida

Vitipec® Combi

Azul

Fungicida de amplo espectro

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Pó molhável (WP) com 4,8% (p/p) de cimoxanil + 28% (p/p) de folpete + 4% (p/p) de tebuconazol

Família química: Acetamida, N-tiotrihalometilo (ftalamida) e triazol

Número de AV: 1619

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 250 g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- VITIPEC® COMBI AZUL é um fungicida sistêmico, com ação preventiva e curativa: bloqueia a germinação dos esporos e garante o controlo dos fungos do mildio e oidio nos primeiros estados de infeção.
- É um fungicida composto por 3 substâncias ativas (s.a.):
 - cimoxanil, s.a. penetrante que impede o desenvolvimento do fungo do mildio antes e imediatamente após o início da infeção.
 - folpete, s.a. de contacto com ação "multi-site" inibe diversos mecanismos das células, nomeadamente a germinação dos esporos e o crescimento do micélio; Tem um efeito estimulante sobre a vegetação e ação secundária sobre podridão cinzenta
 - tebuconazol, s.a. sistêmica com ação preventiva e curativa sobre o fungo do oidio
- O produto é rapidamente absorvido pelas plantas, o que o torna resistente ao arrastamento pela chuva, 2 horas após a aplicação. Migra de forma lenta e regular no interior da planta conferindo por isso uma boa proteção dos novos tecidos.

CULTURA	DOENÇA	CONC. (g/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
VIDEIRA (Uvas para vinificação)	Míldio (<i>Plasmopara viticola</i>) e Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	250	2,5	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar as aplicações às 7 a 8 folhas, em condições favoráveis às doenças. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados quando as condições meteorológicas favorecerem o desenvolvimento das doenças. O intervalo entre tratamentos deverá ser de 10 a 12 dias, encurtado para 7 a 8 caso as condições sejam de chuva. O número máximo de tratamentos a efetuar com este ou outro fungicida com o mesmo modo de ação (DMI) deverá ser de 3, posicionados antes do fecho dos cachos.	42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Recomendamos a aplicação do VITIPEC® COMBI AZUL com carácter preventivo, de forma a assegurar um bom estado fitossanitário durante o decorrer do ciclo vegetativo
- Não se deve aplicar nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto, após aplicações repetidas do mesmo
- A concentração indicada refere-se a aplicações em alto volume; a dose de emprego em pleno desenvolvimento vegetativo é de 2,5 kg/ha.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura

